

Patientvejledning

Bjerringbro Øjenklinik

Ambulant operation for efterstær

Hvad er efterstær?

Ved den grå stær operation bevares linsekapslen/sækken som støtte/fiksation af den nye kunstige linse.

Linsekapslen/sækken kan blive uklar/mat og på ny sløre synet eller give blændingsgener.

Efterstær opstå hos ca 20% - ofte indenfor de første år, men kan opstå både efter kortere eller længere tid (1 uge til flere år) efter operationen for grå stær.

Behandling

Efterstær behandles med Yag laser-lys (YAG-laser) ved at fjerne uklarheden/matheden på linsekapslen.

Behandlingen er smertefri og varer et par minutter. Man vil opleve stærke lysglimt.

Øjet dryppes med pupiludvidende dråber før behandlingen og 2 slags dråber efter behandlingen bl.a. for at forebygge trykstigning i øjet.

Efterbehandling

Der er ikke yderlig efterbehandling

Allerede samme aften vil du kunne mærke en forbedring af synet.

I dagene efter behandlingen er det almindeligt at se svævende fluer/uklarheder.

Komplikationer

Det er yderst sjældent at opleve komplikationer efter behandling for efterstær.

Der er en meget lille risiko for at få hævelse af nethindens gule plet (under 1 pr 3000) samt nethindeløsning (under 1 pr 1000). Hvis du oplever fluer, tråde, lysglimt eller fast skygge skal du kontakte Øjenklinikken.

Med venlig hilsen

Med venlig hilsen

Øjenlæge, Thorsten Boll Matthiesen

www.bjerringbro-ojenklinik.dk

86 68 08 44, telefontid 9-11. Telefonen er døgnåben ugens 7 dage for eventuelt afbud.